


44
485

Teu dur
Imparfait 3 cadence
en 6 ton

9	5	4	4	4	3	3	2	2	3	7	1
3	1	1	2	2	1	1	1	1	3	3	
7	3	4	5	5	5	5	6	6	7	6	
3	6	6	7	7	1	3	4	3	4	5	6



Teu mol
Imparfait 3 cadence
en 6 mineur

Theorema

Si in triangulo
ABC sumatur punctum quodvis
O et ex eo in latera demittantur perpendiculara
AD, OE, OF. erit $AD^2 + BF^2 + CE^2 = BD^2 + CF^2 + AE^2$
eadem proprietas in omnibus pro polygonis locum
habet.

Teu dur
Imparfait 3 cadence
en premier ton

10
16

Teu mol
Imparfait 3 cadence
en 1 ton

45 ⁴⁹⁰⁵ Feu dur
 Perfekte & cadence
 en 6 ton

Feu mol
 Imperfekte & cadence
 en 1 ton

50 ⁴⁹⁰⁶ Feu dur
 Perfekte & cadence
 en 6 ton

Feu mol
 Imperfekte & cadence
 en 1 ton

l. a. II. aa. III. bb. IV. cc. $\sqrt{bb-aa} = b-a.p$
 $\sqrt{cc-aa} = c-a.q$
 $\sqrt{cc-bb}$

$a = \frac{b \cdot p - 1}{p \cdot p + 1}$
 $c = \frac{a \cdot q + 1}{q \cdot q - 1} = \frac{b \cdot p + q \cdot q + 1}{p \cdot p + 1 \cdot q \cdot q - 1}$

$\sqrt{cc-bb} = \frac{b}{p \cdot p + 1 \cdot q \cdot q - 1} \sqrt{p \cdot p - 1 \cdot q \cdot q + 1 - p \cdot p + 1 \cdot q \cdot q - 1} = \frac{2b}{p \cdot p + 1 \cdot q \cdot q - 1} \sqrt{p \cdot p - 1 \cdot q \cdot q - 1}$

Ego. $q \cdot p \cdot p - 1 \cdot p \cdot p - q \cdot q$. Ent. vel. $q \cdot p \cdot p - 1 = p \cdot p - q \cdot q$. quadrat. $q = 1$
 q. $m \cdot p \cdot p - q \cdot q = x$. Ent. vel. $q \cdot p \cdot p - 1 = p \cdot p - q \cdot q$. quadrat. $q = 1$
 II. $q \cdot p + 1 \cdot p - q = q \cdot p - 1 \cdot p + q$. $q = 1$